

# あいち病害虫情報 最新情報

平成30年11月16日  
愛知県農業総合試験場  
環境基盤研究部病害虫防除室

## 晴れの日が多くなる見込み

名古屋地方気象台が本日発表した1か月予報によると、平年と同様に晴れの日が多いと予想されています。

向こう1か月の平均気温は、高い確率60%です。

週別の気温は、1週目・2週目ともに、高い確率60%です。

## キャベツ、ハクサイの害虫

ハクサイほ場でのアブラムシ類の発生量が多い状況です。今後も気温が高く、発生に好適な気象条件が予想されているので、ほ場での発生状況に留意して防除しましょう。11月2日発表の「平成30年度病害虫発生予報第8号」を参考にしてください。

キャベツ、ハクサイの病害虫フェロモントラップによるコナガの誘殺数は平年並ですが、ほ場における発生量は、ハクサイでやや多くなっています。ほ場をよく観察し、早期発見、早期防除に努めましょう。この時期に発生量が多いと、翌春も発生が多くなる傾向にあるため、今のうちに防除しましょう。コナガは薬剤抵抗性が発達しやすいため、同一系統薬剤の連用を避けましょう。また、コナガが発生しているほ場では、収穫後、残渣を速やかにすき込みましょう。

野菜ほ場に設置したフェロモントラップにおけるハスモンヨトウの誘殺数が多い状況です。今後も気温は平年に比べ高く推移する見込みなので、引き続き、ほ場での発生状況に注意し、防除を実施しましょう。

## キャベツ、ハクサイの病害

11月上旬の巡回調査でハクサイべと病が発生しているほ場があります。降雨が続くと多発するため、注意が必要です。

キャベツやハクサイでは、菌核病が発生する時期です。発病株は直ちに抜き取ってほ場外に持ち出し、適切に処分しましょう。なお、本病の病原菌は多くの種類の植物に感染します。菌核病が発生している地域では、他作物での発生にも注意しましょう。

## 果菜類の病害

果菜類の灰色かび病やトマト葉かび病、トマトすすかび病は、施設を密閉し施設内の湿度が高まる11月中下旬頃から発生が多くなります。積極的に換気や送風を行って、多湿にならないようにしましょう。また、発病部位は速やかに取り除き、適切に処分しましょう。

トマトでは、草勢が衰えると、葉かび病の発生が助長されます。生育に応じた肥培管理に努めましょう。

## イチゴの病害虫

ハダニ類は、多発すると防除が難しくなります。ハダニ類の防除では、ミツバチや天敵への影響を考慮して薬剤を選定しましょう。気門封鎖型農薬を積極的に活用し、同一系統薬剤の連用を避けて防除しましょう。天敵を利用する場合は、導入前に薬剤で防除し、ハダニ類の密度を下げてから放飼しましょう。

うどんこ病は、多発すると防除が難しくなるので、初期防除に努めましょう。また、窒素過多は発生を助長するので、適切に肥培管理しましょう。

## キュウリの黄化えそ病

キュウリ黄化えそ病の病原ウイルス（MYSV）は、ミナミキイロアザミウマにより媒介されます。本虫の防除を徹底するとともに、発病株は抜き取り、適切に処分しましょう。

予察灯、フェロモントラップなどの各種調査データは、ホームページ「あいち病害虫情報」（アドレス：<http://www.pref.aichi.jp/byogaichu/investigation.html>）を参照してください。

問合せ先 愛知県農業総合試験場 環境基盤研究部 病害虫防除室 TEL 0561-62-0085 内線471 FAX 0561-63-7820
---